1989	23-28	1	17	Bull. Soc. linn. Bordeaux	
	23-28	1	17	Bull. Soc. linn. Bordeaux	

Contribution à l'étude des Staphylins de la Dordogne (Coleoptera). 4° note.

par Patrick DAUPHIN Poitou, 33570 Lussac.

Résumé: Liste de 37 espèces récemment capturées en Dordogne parmi les Habroceridae, Micropeplidae et Stenidae.

Abstract: List of 37 species of Habroceridae, Micropeplidae and Stenidae recently recorded from Dordogne département, France.

HABROCERIDAE

Habrocerus capillaricornis Graveniorst 1806, (S 97): assez commun, surtout par tamisage; Bonneville (D, P); Saint-Vivien (P).

MICROPEPLIDAE

Micropeplus staphylinoides (MARSHAM 1802), (S 2): peu commun; Bonneville (D).

Micropeplus fulvus Erichson, 1839-40, (S 1): assez commun, dans la paille, le fumier d'oie, etc.; Fraisse, Villefranche-de-Lonchat, Saint-Michel-de-Montaigne (S).

Micropeplus porcatus (FABRICIUS 1792), (S 2): dans des milieux variés, détritus d'inondations, parfois sur les fleurs (se prend en Gironde en battant les Lilas au printemps); peu commun; Bonneville (S).

STENIDAE

Dianous caerulescens (GYLLENHAL 1810), (S 45): très rare; détritus d'inondations; Bonneville (T).

Stenus (Stenus) biguttatus (Linné 1758), (S 35): peu commun; au bord des eaux; Bonneville (D); Piégut-Pluviers (P).

Stenus (Stenus) comma LeConte 1863 (= bipunctatus Erichson 1837-39), (\$35): rare; gravières, Le Fleix (P).

Stenus (Stenus) guttula MULLER 1816, (S 36): peu commun; gravières, Le Fleix (P); bords de la Lidoire, Saint-Michel-de-Montaigne (S).


Stenus (Stenus) longitarsis Thomson 1851, (\$37): rare; détritus d'inondations, Saint-Vivien (\$).


Stenus (Stenus) juno Fabricius 1801, (S 36): rare; bord de ruisseau, Bonneville (P).


Stenus (Stenus) providus Ericlison 1837-39 (= rogeri Kraatz 1856-58), (S 37): une des espèces les plus communes, toute l'année, dans les milieux les plus variés, surtout la forme rogeri; marécages, détritus d'inondations, Bonneville (D,P,S,T,C); paille, Saint-Vivien (S); détritus d'inondations, Moulin-Neuf (G).

Stenus (Stenus) clavicornis (Scopoli 1763), (S 35): peu commun; détritus d'inondations, Bonneville (T); bords ruisseau, Bonneville (P); Vanxains (J).

Fig. 1 : Stenus (Parastenus) ludyi FAUVEL; a - édéage, face dorsale (échelle: 0,5 mm), b - extrémité du lobe médian (échelle: 20 μm), c - dernier sternite (échelle: 0,5 mm).







Stenus (Stenus) bimaculatus Gyllenhal 1810, (S 35): peu commun; détritus d'inondations, Bonneville (D, S).

Stenus (Nestus) pusillus Stephens 1832, (S 40): très commun partout, toute l'année; marécages, détritus d'inondations, foin, Bonneville (D, S, T, P); bords étang, Eygurande (P); Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien (S); La Jemaye (J).

Stenus (Nestus) morio Gravenhorst 1806, (S 40): assez commun en Gironde mais semble bien plus rare en Dordogne; Saint-Avit-Saint-Nazaire (P).

Stenus (Nestus) argus Gravenhorst 1806, (S 37): rare; Le Pizou (S).

Stenus (Nestus) boops Ljungh 1804, (\$ 38): peu commun; La Jemaye (J); Le Buisson (P).

Stenus (Tesnus) brunnipes STEPHENS 1832, (S 41): foin, Bonneville (D); détritus d'inondations, Saint-Vivien (S).

Stenus (Tesnus) crassus Stephens 1832, (S 41): rare; Bonneville (D).

Stenus (Hemistenus) leprieuri Cussac 1851, (S 43): rare; détritus d'inondations, Saint-Vivien (S).

Stenus (Hemistenus) picipennis ERICHSON 1840, (S 43): rare; bords ruisseau, Bonneville (P).

Stenus (Hemistenus) flavipes Stephens 1832, (S 43): commun; détritus d'inondations, Saint-Vivien (S), Bonneville (S), Montpeyrou (S); paille, Saint-Michel-de-Montaigne (S).

Stenus (Hemistenus) picipes STEPHENS 1832, (S 43): assez commun dans les détritus d'inondations; Moulin-Neuf (G); Bonneville, Saint-Vivien (S).

Stenus (Hemistenus) canescens Rosenhauer 1856, (S 43): rare; Bonneville (D).

Stenus (Hemistenus) binotatus LJUNGH 1804, (S 42): rare; détritus d'inondations, Bonneville (S).

Stenus (Hemistenus) pallitarsis STEPHENS 1832, (S 43): rare; détritus d'inondations, Bonneville (S).

Stenus (Hypostenus) kiesenwetteri Rosentauer 1856, (S 42): espèce remarquable, qui n'est pas très rare en Dordogne; Bonneville (D, S); paille, Saint-Michel-de-Montaigne (S).

Stenus (Hypostenus) cicindeloides SCHALLER 1883, (S 42): peu commun; détritus d'inondations, Bonneville (D, S).

Stenus (Hypostenus) tarsalis Liungh 1804, (S 43): rare; détritus d'inondations, Saint-Vivien (S).

Stenus (Hypostenus) similis (HERBST 1784), (S 42): peu commun; détritus d'inondations, Bonneville (S); préhumide, fauchage, Le Pizou (G).

Stenus (Hypostenus) fulvicornis STEPHENS 1832, (S 42): assez commun; détritus d'inondations, Bonneville (T, D, S), Saint-Vivien (S).

Stenus (Parastenus) aceris Stephens 1832, (S 44): assez commun; lavage de terre, près de Pessac-sur-Dordogne (S); tamisage, Bonneville (D).

Stenus (Parastenus) impressus German 1824, (S 45): assez commun; mousses, Port-Sainte-Foy (P); Bonneville, Montpeyroux (D).

Stenus (Parastenus) subaeneus Erichson 1839-40, (S 45): assez commun; mousses, Bonneville (P); détritus d'inondations, Saint-Vivien (S); La Jemaye (J).

Stenus (Parastenus) ossium Stephens 1832, (S 45): assez commun; détritus d'inondations, Bonneville (T, S); bords mare, Chervail (P).

Stenus (Parastenus) ludyi Fauvel 1864 (Fig. 1), (B 76): rare; lavage de terre, près de Pessac-sur-Dordogne (S); Fougueyrolles (S).

Stenus (Parastenus) ochropus Kiesenwetter 1858 (= erichsoni Rye 1864), (S 45): assez commun; mousses, Port-Sainte-Foy, Le Fleix (P); Bonneville (D).

Abréviations: Pour la référence bibliographique de chaque espèce, S correspond à Scheerpeltz (1968) et B à Benick (1929); pour les récolteurs, les conventions sont les suivantes: C: Jacques Coffin; D: Christian Duverger; G: Renaud Gallis; J: Claude Jeanne; P: Patrick Dauphin; S: Bernard et Michel Secq; T: Hervé Thomas.

Remerciements : J'ai le plaisir d'exprimer ma gratitude au Dr Volker Puthz, éminent spécialiste des *Stenus*, pour ses remarques et conseils concernant cette liste.

Bibliographie

- Benick (L.), 1929. Steninae (Staphylinidae), in: Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren. Heft 96, 103 p., Troppau.
- FAUVEL (A.), 1872-1875. Staphylinides, in Faune Gallo-Rhénane, 3, 738 p.
- LHOSE (G.A.), 1965. Staphylinidae, in Freude (H.), HARDE (K.W.) et LHOSE (G.A.), Die Käfer Mitteleuropas, Band 4 (1). Goecke & Evers, Krefeld, 264 p.
- Putнz (V.), 1966. Über Westmediterrane, insbesondere marokkanische *Stenus* Arten. *Bull. Soc. Sci. nat. phys. Maroc*, 46: 267-280.
- Putiiz (V.), 1967. Zwei neue Stenus Arten aus Italien nebst einer synonymischen bemerkung. Annali Mus. civ. Stor. nat. Giacomo Doria, Genova, 78: 52-58.
- Putitz (V.), 1968. Die Stenus und Megalopinus Arten Mots. und Bemerkungen über das Subg. Tesnus Rey. Notul. ent., 48: 197-219.
- Putiiz (V.), 1970. Über die gruppe des Stenus pusillus Steph. Annls Ent. Fenn., 36 (4): 204-212.
- Putiiz (V.), 1972. Die subgenus *Hemistenus. Annls Ent. Fenn.*, 38 (2): 76-92.
- REY (C.), 1882. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Tribu des Brévipennes, Micropéplides, Sténides. *Annls Soc. linn. Lyon*, 30, 416 p.
- SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1907. Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine, Staphylinidae. Publication de la Société entomologique de France, 1-160.
- SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1932. Catalogue raisonné des Coléoptères de France. Abeille, Paris, 36 (1), 160 p.
- Scheerpeltz (O.), 1968. Staphylinidae, in Catalogus Faunae Austriae, 15, 279 p., Wien.